

Standing order for Preterm labor

- Admit LR
 - CBC with platelet
 - UA
 - On EFM
 - Observe UC, FHS
 - Notify Ped.
 - Adalat (10 mg) 1 tab Oral q 15 min. x 4 doses
 - Then Adalat
..... mg Oral q hr
 - ประเมิน BP ก่อนให้ยา Adalat ทุกครั้ง If BP < 90/60 mmHg please notify
 - เจาะ DTX ก่อนให้ยา Bricanyl ทุกครั้ง If DTX > 120 mg% พิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้ Bricanyl
 - Bricanyl (0.5 mg)
1/2 amp SC / IV stat
 - Then Bricanyl 5 amp + 5%D/W 500 ml
IV drip 60 – 300 ml/hr (15 – 75 drop/min)
Titrate increase 30 ml/hr q 10 min until no UC & คง rate เดิมไว้ 8 hr
 - Then Bricanyl (0.5 mg)
1/2 amp SC q 4 hr x 6 doses
 - If maternal PR > 120 /min or maternal palpitation please notify
 - Dexamethasone
6 mg IM q 12 hr x 4 doses
 - Ampicillin
2 g IV stat then 1 g IV q 4 hr เมื่อเข้า active phase
-
- 50% MgSO₄ loading 4 g + NSS 32 ml IV slow push in 15 – 20 min
 - Then 50% MgSO₄ 80 ml (40 g) + 5% D/W 920 ml
IV drip 50 ml/hr (2 g/hr) x 24 – 48 hr

- Retained foley's catheter & record urine output if < 100 mL/4 hr please notify
 - If RR < 12 /min or absent patellar deep tendon reflex please notify
 - Serum Mg level q 4 hr
-

- Indomethacin
50 mg Oral stat then 25 mg Oral q 6 hr x 8 doses